



04 ANS D ACTIVITE ONCOLOGIE AU SERVICE DE GYNECOLOGIE CHU BEO :

Dr. D. AGUIDA- Dr. C. AID- Dr. M. YAICI

Service de Gynécologie-Obstétrique, Centre Hospitalo-universitaire de BEO, Alger

FACULTÉ DE MÉDECINE D'ALGER




INTRODUCTION

Le cancer est un problème majeur de santé publique partout dans le monde. En 2020, l'Afrique a enregistré 1,1 million de nouveaux cas de cancers et plus de 700 mille décès dus à ce fléau [1]. Le cancer constitue aujourd'hui la 5ème cause de décès en Afrique [2]. Les cancers gynécologiques regroupent les cancers du col et du corps de l'utérus, de l'ovaire, de la vulve, du vagin, de la trompe de Fallope et les tumeurs trophoblastiques gestationnelles [3]. Leur distribution et leur fréquence varient selon les régions du monde mais elles constituent l'une des principales causes de décès par cancer dans le monde [4]. La connaissance des caractéristiques de ces affections au sein des populations est un atout dans la mise en œuvre des stratégies de prévention et de contrôle du cancer. L'objectif de cette étude était de déterminer la fréquence des cancers gynécologiques en pratique oncologique au service GO de CHU BEO et d'étudier les aspects épidémiologiques et histocliniques de ces affections.

Epidémiologie:


Dans le monde, environ 2 millions de cancers gynécologiques apparaissent chaque année, ce qui représente presque 50% des cancers féminins. Il s'agit dans plus d'un million de cas de cancers du sein, dans 500 000 cas des cancers du col de l'utérus, dans 200 000 cas des cancers du corps de l'utérus et pour les 200 000 derniers d'autres cancers gynécologiques (ovaires, vulve, vagin). Ces cancers donnent lieu à 850 000 décès, soit 30% des décès par cancer chez les femmes, dont plus de 400 000 sont dus aux cancers du sein, 273 000 aux cancers du col utérin, 50 000 à ceux du corps de l'utérus et 125 000 aux autres cancers gynécologiques. Ce panorama varie avec le niveau économique des différents pays, tant en incidence, en raison de variations dans les facteurs étiologiques, qu'en mortalité, en raison des différences d'accès aux soins. Dans les pays à niveau économique élevé, on retrouve 64% des décès mondiaux par cancers du sein et 69% de ceux par cancers du corps utérin du fait de leur fréquence dans ces pays; pour les autres cancers gynécologiques, la part de la mortalité mondiale due à ces cancers est de 48% et seulement de 7% pour les cancers du col de l'utérus dont l'incidence, dans ces pays, est basse [1]. Ainsi, le 2e cancer le plus fréquent chez la femme est observé dans 90% des cas dans les pays à niveau de développement faible où la plupart des femmes n'ont aucun accès à une prise en charge préventive par le dépistage, voire à un diagnostic précoce permettant un traitement curatif.

Répartition des cancers gynécologiques au service GO de BEO de 2020-2023




Statistiques:


Répartition des types histologiques / IHC du cancer du sein dans 4 ans 2020-2023




Types histologiques du Cancer du col: Répartition dans 04 ans




Cancer du col : FIGO 2018




Cancer de l'endomètre : FIGO 2018



CANCER DE L OVAIRE:TYPE HISTOLOGIQUE 2020-2023




CANCER DE L ENDOMÈTRE: TYPES HISTOLOGIQUES RÉPARTIES DANS LES ANNÉES 2020-2023




Prise en charge: décision RCP


CANCER DU SEIN



CANCER DU COL:



CANCER DE L OVAIRE:



CANCER DE L ENDOMETRE:

