

Quoi faire pour ne pas passer à côté d'un cancer de sein lors de la grossesse ou le postpartum : étude de 8 cas !

Dr SAIDI ; Dr BENABED ; Dr DJELTI ; Pr BENMOUMEN

INTRODUCTION :

Le cancer de sein est le cancer féminin le plus fréquent .

L'association d'un cancer de sein et grossesse (**CSAG**) est un évènement rare. Elle est définie par la survenue d'un cancer sein pendant la grossesse ou durant l'année suivant l'accouchement .

Observations :

Il s'agit d'une étude colligeant 8 patientes chez qui un cancer du sein était diagnostiquée au cours de la grossesse ou dans l'année de post partum .

Parmi ces 8 patientes ; il y a 5 qui ont orienté à notre niveau à EHS NOUAR FADELA ORAN pour la prise en charge d'un cancer de sein découvert lors de premier trimestre à des stades différents.

Et 3 autres patientes qui ont déjà accouchées à notre niveau et qui ont ré-consulter pour la découverte des nodules et des tuméfactions mammaire lors de la période de l'allaitement .

L'âge de patiente était entre 30 ans aux 48 ans .

leur gestité et leur parité étaient différentes .

résultats :

Parmi une cinquantaine de cas de cancer de sein qui consulte a notre structure dans l'année ; on trouve toujours en moyenne de 6 à 7 cas sont des cancer de sein associé à la grossesse .

Les patientes présentant un cancer de sein associé au premier trimestre ont bénéficié d'une interruption thérapeutique de la grossesse pour qu'il puisse entamer leur radiothérapie .

Les patientes ayant découvert leur cancer dans le post partum ont été obligé d'arrêter aussi l'allaitement maternel .

Le diagnostic de cancer de sein lors de la grossesse ou de postpartum est difficile et tardif due aux modifications physiologiques habituelles de la glande mammaire (augmentation de taille ; mastodynie ; obstructions des canaux lactifères donnant de nodules palpables) .

Discussions :

L'association de cancer de sein avec la grossesse est une situation stressante pour la maman et le médecin traitant .

Ne pas banaliser les nodules ; les écoulements chez les femmes jeunes enceintes ou allaitantes .

Le pronostic de cancer de sein est plus péjoratif chez ses patientes due leur jeune âge et le risque de diagnostic tardif .

Conclusion :

le traitement d'un cancer de sein au cours d'une grossesse doit respecter la vie de la mère en premier .

S.SAIDI : médecin résidente en gynécologie obstétrique

EHS NOUAR FADELA ex SAINT ANNE -ORAN

Sarahma072@vahoo.email.com